

Tratamiento audiológico de adultos con pérdida auditiva de severa a profunda

Guía de prácticas recomendadas¹



Pérdida auditiva de leve a moderada:
ampliamente comprendida
frente a
Pérdida auditiva de severa a profunda:
poca orientación disponible

Definición²:

Pérdida auditiva severa: media de 61-80 dB HL
Pérdida auditiva profunda: media > 81 dB HL



2/10

de los adultos que buscan tratamiento padecen pérdida auditiva de severa a profunda³



Recomendaciones consensuadas de un grupo de expertos

Las personas con pérdida auditiva de severa a profunda necesitan...



Asesoramiento continuo sobre las tecnologías auditivas

Estas conversaciones son vitales para comprender que los audífonos no tienen por qué ser la última parada en su viaje de la audición.



Consideración adicional al seleccionar y adaptar audífonos

Para mantener la audibilidad y admitir el reconocimiento verbal asistido, se requieren enfoques de adaptación más allá de la "adaptación inicial" estándar.



Consideración inmediata de micrófonos remotos

La tecnología de micrófono remoto debe considerarse al mismo tiempo que la selección de audífonos y/o implantes cocleares.



Formación y estrategias de comunicación

Más allá de la tecnología auditiva, las habilidades de comunicación se pueden mejorar con la formación de habilidades auditivas y estrategias de comunicación.



Enfoque temprano en los acúfenos

Aproximadamente el 50 % de estas personas padecen acúfenos y abordar la pérdida auditiva es el punto de partida para el tratamiento.



Para abordar con éxito estas complejas necesidades es preciso el desarrollo profesional continuo de habilidades que favorezcan el bienestar de los usuarios a través de:

1. Optimización y mantenimiento continuos de los dispositivos auditivos
2. Estrategias de autotratamiento
3. Asesoramiento y soporte
4. Derivación posterior, cuando proceda



Empiece hoy mismo con las nuevas recomendaciones de expertos sobre el tratamiento de la pérdida auditiva de severa profunda en www.phonakpro.com/severe-to-profound-hearing-loss

¹ Turton, L. (editor), Souza, P., Thibodeau, L., Hickson, L., Gifford, R., Bird, J., Stropahl, M., Galley, L., Fulton, B., Scarinci, N., Ekberg, K., Timmer, B. (2020). Guidelines for Best Practice in the Audio-logical Management of Adults with Severe and Profound Hearing Loss. *Seminars in Hearing*, 41(3), 141-245.

² Organización Mundial de la Salud (OMS; 2012). Promoting ear and hearing care through CBR Community-Based Rehabilitation. Organización Mundial de la Salud. Extraído de http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html, consultado el 26 de julio de 2019.

³ Carlsson P, Hjalldahl J, Magnuson A, Terneval E, Eden M, Skagerskarand A, & Jonsson R (2014). Severe to profound hearing impairment: quality of life, psychosocial consequences and audiological rehabilitation. *Disability & Rehabilitation, Early Online*: 1-8.