

Audiologisk håndtering af voksne med kraftig til svær hørenedsættelse

Retningslinjer for bedste praksis¹



Mild til moderat hørenedsættelse:

ganske godt belyst

ift.

Kraftig til svær hørenedsættelse:

meget begrænsede retningslinjer tilgængelige

Definition²:

Kraftig hørenedsættelse: gennemsnitligt 61-80 dB

Svær hørenedsættelse: gennemsnitligt > 81 dB



2/10

voksne, der søger behandling, har kraftig til svær hørenedsættelse³



Ekspertpanels konsensusanbefalinger

Personer med kraftig til svær hørenedsættelse har brug for...



Rådgivning om sammenhængende høreteknologier

Disse samtaler er afgørende for at forstå, at høreapparater ikke behøver at være det sidste stop på deres vej mod en bedre høreelse.



Omhyggelig overvejelse ved valg og tilpasning af høreapparater

For at opretholde hørbarhed og understøtte assisteret talegenkendelse kræves tilpasningsmetoder ud over den almindelige "førstegangstilpasning".



Umiddelbar overvejelse om eksterne mikrofoner

Teknologien med eksterne mikrofoner bør overvejes samtidig med valg af høreapparater og/eller cochlear implantater.



Træning og strategier om kommunikation

Ud over høreteknologi kan kommunikationsevner forbedres med træning af høreevnen og brug af kommunikationsstrategier.



Tidlig fokus på tinnitus

Cirka 50 % af disse personer rapporterer om tinnitus, og behandling af hørenedsættelse er udgangspunktet for behandlingen.



Hvis disse komplekse behov skal kunne håndteres med succes, kræver det, at der konstant udvikles nye professionelle færdigheder, som hjælper med din klients velvære:

1. Fortsat optimering og vedligeholdelse af høreapparaterne
2. Selvhjælpsstrategier
3. Rådgivning og hjælp
4. Videre henvisning, hvor det er relevant



Start i dag med ny ekspertvejledning om håndtering af kraftig til svær hørenedsættelse ved at besøge <https://www.phonakpro.com/dk/da/resources/counseling-tools/kraftig-til-svaer/oversigt.html>

¹ Turton, L. (editor), Souza, P., Thibodeau, L., Hickson, L., Gifford, R., Bird, J., Stropahl, M., Gailley, L., Fulton, B., Scarinci, N., Ekberg, K., Timmer, B. (2020). Guidelines for Best Practice in the Audiological Management of Adults with Severe and Profound Hearing Loss. *Seminars in Hearing*, 41(3), 141-245.

² Verdenssundhedsorganisationen (WHO) (2012). Promoting ear and hearing care through CBR Community-Based Rehabilitation. Verdenssundhedsorganisationen. Hentet fra http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html, åbnet den 26. juli 2019.

³ Carlsson P, Hjalldahl J, Magnuson A, Terneval E, Eden M, Skagerskarand A, & Jonsson R (2014). Severe to profound hearing impairment: quality of life, psychosocial consequences and audiological rehabilitation. *Disability & Rehabilitation, Early Online*: 1-8.